




6.1 Laisvai auginamos kiaulės – jų šėrimo strategijos ir genotipo įtaka gyvūnų elgesiui, našumui ir mėsos kokybei

Pašarų veiksmingumas

Patartina riboti koncentrato kiekį šeriant laisvai laikomų kiaulių (įvairių veislių mišrūnų) pašarais, siekiant sumažinti šėrimo kaštus, kurie paprastai sudaro daugiau nei 60-70% visų gamybos kaštų.

Buvo pastebėtas koncentrato kiekio mažinimo kiaulių mityboje (su vitaminų ir mineralų papildais arba be jų) dviejų skirtingų kiaulių genotipams (šiuolaikiniams ir tradiciniams mišrūnams) poveikis gamybos našumui, mėsos kokybei ir laisvai laikomų gyvulių elgesiui.

SLAUGHTER WEIGHT AND MEAT PERCENTAGE



<https://orgprints.org/id/eprint/24635/7/24635.pdf> (skaidrė Nr. 24)

Sumažinus koncentrato kiekį, dienos prieaugis sumažėja 20-24%, bet pašarų konversijos koeficientas (FCR) pagerėja 9-14%, nepriklausomai nuo kiaulės genotipo. Be to, kiaulės skerdenoje mėsos dalis yra didesnė, tačiau sumažėja nugarinės raumenų paviršius. Intensyvėja ir gyvulių aktyvumas, nes jie suvartoja daugiau žaliųjų pašarų ir intensyviau knaisioja.

Pakeitus kiaulių mitybą, mėsa tampa ne tokia minkšta, bet jos kvapas ir skonis nepakinta.

<https://orgprints.org/id/eprint/24635/7/24635.pdf>