

1.1 Προσεκτική επιλογή της καλύβας τοκετού (περιοχή κατάκλισης), απομόνωση του δαπέδου της καλύβας από το κρύο / υγρό χώμα, η χρήση της στρωμνής

Μείωση της θνησιμότητας

Συνιστάται μεγάλη ποσότητα άχυρου (δηλαδή 10-40 κιλά ανά στρωμνή) ή/και ξύλινη ή τσιμεντένια πλατφόρμα πάνω από το έδαφος και κάτω από την καλύβα τοκετού, ώστε να αποφευχθεί η επαφή των νεογέννητων χοιριδίων με το κρύο και υγρό έδαφος και να περιοριστεί έτσι η θνησιμότητά τους λόγω θερμικής δυσφορίας και σύνθλιψης

Σε μια φάρμα βιολογικής εκτροφής χοίρων με 85 χοιρομητέρες στην Ιταλία, απογαλακίζονται ετησίως κατά μέσο όρο 11,8 χοιρίδια ανά χοιρομητέρα, με ποσοστό θνησιμότητας 21%



Με την πρακτική αυτή, εξασφαλίζεται καλύτερη θερμική άνεση και χαμηλότερη θνησιμότητα για χοιρίδια που εκτρέφονται σε εξωτερικούς χώρους σε βαριά αργιλώδη εδάφη που δεν στραγγιζονται καλά, ειδικά σε κρύες και βροχερές εποχές και κλίματα

info@crpa.it

https://www.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=1109