



3.1 Σενάριο περίπτωσης κτηνοτροφικών ζώων

Βέλτιστες στρατηγικές εμβολιασμού

Η πρακτική αφορά στην εισαγωγή ενός προγράμματος εμβολιασμού κατά του Αναπαραγωγικού και Αναπνευστικού Συνδρόμου των χοίρων (PRRS) σε χοιροτροφείο ελεύθερης βοσκής για όλες τις κατηγορίες χοίρων.

Το πρόγραμμα εμβολιασμού συνίσταται στον εμβολιασμό των θηλυκών σε ηλικία 5 μηνών και τον επανεμβολιασμό τους 4 εβδομάδες αργότερα. Επιπλέον, οι χοιρομητέρες εμβολιάζονται περίπου κάθε 6 μήνες. Ως αποτέλεσμα, το κοπάδι είναι απαλλαγμένο από τον ιό του Αναπαραγωγικού και Αναπνευστικού Συνδρόμου των Χοίρων (PRRS). Όλες οι χοιρομητέρες, οι δύο κάπροι και οι παχυνομενοί χοίροι ήταν υγιείς.

Ο εμβολιασμός για την πρόληψη της μόλυνσης αποκτά αυξανόμενη σημασία λόγω της αυξανόμενης εμφάνισης ανθεκτικότητας των παθογόνων στα αντιβιοτικά και των αυξανόμενων απαιτήσεων των καταναλωτών για ασφάλεια των τροφίμων.

www.thepigsite.com/news/2018/03/vaccination-strategies-in-the-context-of-antibiotic-reduction-3

Η εισαγωγή ενός προγράμματος εμβολιασμού αυξάνει το κόστος παραγωγής αλλά προστατεύει από ασθένειες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα μειωμένες απώλειες στην παραγωγή. Δυστυχώς, άλλοι λόγοι (π.χ. ανεπαρκής βιοασφάλεια) μπορεί να επηρεάσουν τη θνησιμότητα των χοιριδίων.

Η εισαγωγή ενός προγράμματος εμβολιασμού αυξάνει το κόστος παραγωγής αλλά προστατεύει από ασθένειες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα μειωμένες απώλειες στην παραγωγή. Δυστυχώς, άλλοι λόγοι (π.χ. ανεπαρκής βιοασφάλεια) μπορεί να επηρεάσουν τη θνησιμότητα των χοιριδίων.

www.aavmc.org/data/files/case-study/brucella%20-%20livestock%20case%20scenario.pdf